

## 完全流体力学 試験問題 (2)

1993-9-24, 12:45~14:25

by E. Yamazato

1. (25) 複素ポテンシャル  $w = -i \ln z + 2z$  で与えられる流れについて (1) これはどういう型の流れを組み合わせたものか. (2) 速度ポテンシャルと流れの関数を求めよ. (3)  $r = 1, \theta = 3\pi/2$  における速度を求めよ.

2. (25) (1) 二次元の渦流れにおいて, 速度成分が  $u = 4y, v = 2x$  なる流れは理論上存在しうるか. (2) その流れの流線を求めよ. (3) 直線  $y = 1, y = 3, x = 2, x = 5$  で区切られた長方形のまわりの循環値を求めよ.

3. (25) 図に示すような  $4a$  の長さの平板に  $\alpha$  なる傾きをもち, かつ循環をもつ流れがある. (1) 流れの複素ポテンシャルを求めよ. (2) 平行流れ ( $w$ -平面) から平板に至る写像関係を示し, かつ流れをスケッチせよ. (3) 平板の後端に岐点ができるようにしたときの循環値を求めよ.

4. (25) 速度  $U$  の一様流れ中に, 循環  $-\Gamma$  の渦と  $x = a$  に強さ  $Q$  の吹き出しがある場合,  $z = 0$  の渦に作用する力を求めよ.

## 完全流体力学 試験問題 (2)

by E. Yamazato

9-24-1993, 12:45~14:25

1. (25) 複素ポテンシャル  $w = -i \ln z + 2z$  で与えられる流れについて (1) これはどういう型の流れを組み合わせたものか. (2) 速度ポテンシャルと流れの関数を求めよ. (3)  $r = 1, \theta = 3\pi/2$  における速度を求めよ.

(解)

(1) *Circulation + parallel flow*

$$(2) w = -i \ln(re^{i\theta}) + 2re^{i\theta} = -i \ln r + \theta + 2r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ = (\theta + 2r \cos \theta) + i(2r \sin \theta - \ln r)$$

$$\varphi = \theta + 2r \cos \theta, \quad \psi = 2r \sin \theta - \ln r$$

$$\frac{dw}{dz} = -\frac{i}{z} + 2 = 2 - i\frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta)$$

$$\text{At } r = 1, \quad \theta = \frac{3\pi}{2}; \quad \frac{dw}{dz} = 2 - i\{0 - i(-1)\} = 3, \quad V = 3$$

2. (25) (1) 二次元の渦流れにおいて, 速度成分が  $u = 4y, v = 2x$  なる流れは理論上存在するか. (2) その流れの流線を求めよ. (3) 直線  $y = 1, y = 3, x = 2, x = 5$  で区切られた長方形のまわりの循環値を求めよ.

(解)

$$(1) \operatorname{div} V = 0$$

$$(2) \frac{dx}{4y} = \frac{dy}{2x}, \quad 2x dx - 4y dy = 0, \quad x^2 - 2y^2 = c$$

$$(3) 4(5 - 2) + 10(3 - 1) - 12(5 - 1) - 4(1 - 3) = 12m^2/s$$

$$\Gamma = \int_2^5 \int_1^3 \left( \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= - \int_1^3 6 dy = -(18 - 6) = -12m^2/s$$

3. (25) 図に示すような  $4a$  の長さの平板に  $\alpha$  なる傾きをもち、かつ循環をもつ流れがある。  
 (1) 流れの複素ポテンシャルを求めよ。(2) 平行流れ ( $w$ -平面) から平板に至る写像関係を示し、  
 かつ流れをスケッチせよ。(3) 平板の後端に岐点があるようにしたときの循環値を求めよ。

(解)

$$w = U\left(z_1 + \frac{a^2}{z_1}\right) - \frac{i\Gamma}{2\pi} \ln z_1, \quad z_2 = z_1 e^{i\alpha}, \quad z = z_2 + \frac{a^2}{z_2}$$

$$\frac{dw}{dz_1} \frac{dz_1}{dz_2} \frac{dz_2}{dz} = 0$$

$$\left(\frac{dw}{dz_1}\right)_A = U\left(1 - \frac{a^2}{z_1^2}\right) - \frac{i\Gamma}{2\pi z_1} = 0$$

$$\text{At point } A, \quad z = 2a, \quad z_2 = a, \quad z_1 = z_2 e^{-i\alpha} = a e^{-i\alpha}$$

$$\left(\frac{dw}{dz_1}\right)_A = U\left(1 - \frac{a^2}{a^2 e^{-2i\alpha}}\right) - \frac{i\Gamma}{2\pi a e^{-i\alpha}} = 0$$

$$U(1 - e^{2i\alpha}) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} e^{i\alpha} = 0$$

$$U(e^{-i\alpha} - e^{i\alpha}) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} = 0$$

$$U(\cos \alpha - i \sin \alpha - \cos \alpha - i \sin \alpha) - \frac{i\Gamma}{2\pi a} = 0$$

$$\Gamma = -4\pi a U \sin \alpha \quad (\Gamma : \text{negative})$$

4. (25) 速度  $U$  の一様流れ中に、循環  $-\Gamma$  の渦と  $x = a$  に強さ  $Q$  の吹き出しがある場合、 $z = 0$

の渦に作用する力を求めよ。

(解)

$$w = Uz - \frac{i\Gamma}{2\pi} \ln z + \frac{Q}{2\pi} \ln(z - a)$$

$$\frac{dw}{dz} = U - \frac{i\Gamma}{2\pi z} + \frac{Q}{2\pi(z - a)}$$

$$\left(\frac{dw}{dz}\right)^2 = U^2 - \frac{\Gamma^2}{4\pi^2 z^2} + \frac{Q^2}{4\pi^2(z - a)^2} + \frac{iU\Gamma}{\pi z} + \frac{UQ}{\pi(z - a)} + \frac{i\Gamma Q}{2\pi^2 z(z - a)} - \frac{i\Gamma Q}{2\pi^2 a z}$$

$$\frac{1}{z(z - a)} = \frac{1}{a(z - a)} - \frac{1}{az}$$

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \oint \left(\frac{dw}{dz}\right)^2 dz = \frac{i\rho}{2} 2\pi i \left(\frac{iU\Gamma}{\pi} - \frac{i\Gamma Q}{2\pi^2 a}\right) = -i\rho\Gamma\left(U - \frac{Q}{2\pi a}\right)$$

$$F_x = 0, \quad F_y = \rho\Gamma\left(U - \frac{Q}{2\pi a}\right)$$