

流体力学 III 試験問題

1971-10-13

by E. Yamazato

1. 吹き出し流量が Q で、吹き出し点が原点にあり、さらに X 軸に平行な速度の流れがこれに加わった場合、この組み合わせられた流れの岐点とそこを通る流線は $\psi = \frac{1}{2}Q$ で示されることを示せ。また、この流れからできる楕円物体（境界壁）の最大幅を求めよ。

2. 複素ポテンシャルが $w = -i\ln z + 2z$ で与えられる流れについて：

(1) これはどういう型の流れを組み合わせたものか

(2) Potential function, Stream function を求めよ

(3) Stagnation point(or points) を求めよ

(4) $r = 1$, $\theta = \frac{3}{2}\pi$ にこける速度を求めよ。

3. 図に示す二次元広がりダクト内を流量 $20\text{cm}^3/\text{s}$ の流体が流れている。ただし、 $\rho = 2\text{kgs}^2/\text{cm}^4$ とする。

(1) もし、Potential flow とすればどういう型の流れか

(2) Potential flow の仮定の下で A 点の速度を求めよ。

(3) A 点における圧力勾配を求めよ

(4) 一次元流れの仮定で A 点の速度を求めよ。

4. 球の中心がある時刻 t で y 軸の正の方向に 10m/s の速さで動いており、その加速度は一定で 1m/s^2 である。いま球の半径が $y = -1\text{m}$ からの距離に逆比例するものとして球の表面の境界条件を求めよ。

(解)

1.

$$\varphi = Ur \cos \theta + m \ln r, \quad \psi = Ur \sin \theta + m\theta$$

$$\text{At stagnation points, } U - \frac{m}{U} = 0, \quad r_s = \frac{m}{U}$$

$$\psi = U \frac{m}{U} \sin \pi + m\pi = \frac{Q}{2}, \quad \psi = Ur \sin \theta + m\theta = \frac{Q}{2}$$

2.

(1) *Circulation + parallel flow*

$$(2) \quad w = -i \ln(re^{i\theta}) + 2re^{i\theta} = -i \ln r + \theta + 2r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$= (\theta + 2r \cos \theta) + i(2r \sin \theta - \ln r)$$

$$\varphi = \theta + 2r \cos \theta, \quad \psi = 2r \sin \theta - \ln r$$

$$(3) \quad \frac{dw}{dz} = -\frac{i}{z} + 2 = 2 - i\frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta) = 0$$

$$z = \frac{i}{2} = x + iy \quad x = 0, \quad y = \frac{1}{2}$$

$$(4) \quad \text{At } r = 1, \quad \theta = \frac{3\pi}{2}; \quad \frac{dw}{dz} = 2 - i\{0 - i(-1)\} = 3, \quad V = 3$$

3.

$$(1) \quad \varphi = \ln r, \quad v_r = \frac{m'}{r}, \quad m' = \frac{Q'}{2\pi}$$

$$Q = \frac{60}{360}Q' = \frac{1}{6}Q', \quad Q' = 6Q = 6 \times 20 = 120\text{cm}^3/\text{s}, \quad m' = 19\text{cm}^3/\text{s}$$

$$(2) \quad v_{rA} = \frac{m'}{r_A} = \frac{Q'}{2\pi r_A} = \frac{120}{(2\pi \times 20)} = 0.55 \text{ cm/s}$$

$$(3) \quad v_r \frac{dv_r}{dr} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr}, \quad \frac{dp}{dr} = -\rho v_r \left(\frac{dv_r}{dr} \right)_A = \frac{\rho m'^2}{r_A^3}$$

$$\left(\frac{dp}{dr} \right)_A = \frac{(1.204 \times 10^{-6} \times 19.1^2)}{34.6^3} = 0.01 \times 10^{-6}$$

$$(4) \quad v_{rA} = \frac{Q}{A} = \frac{20}{40} = 0.5 \text{ cm/s}$$

4.

$$F = x^2 + (y - 10t - \frac{t^2}{2})^2 + z^2 - \frac{1}{(1 + 10t + t^2/2)^2} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - 10t - \frac{t^2}{2}), \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 2z$$

$$\frac{\partial F}{\partial t} = -2(t + 10)(y - 10t - \frac{t^2}{2}) + 2(1 + 10t + \frac{t^2}{2})^{-3}(t + 10)$$

$$\frac{DF}{Dt} = 2ux + 2v(y - 10t - \frac{t^2}{2}) + 2wz + 2(t + 10)\{(1 + 10t + \frac{t^2}{2})^{-3} - y + 10t + \frac{t^2}{2}\} = 0$$

$$ux + v(y - 10t - \frac{t^2}{2}) + wz + \{(t + 10)(1 + 10t + \frac{t^2}{2})^{-3} - y + 10t + \frac{t^2}{2}\} = 0$$